6. Nombre total d'électrons de valence : 7 , soit 3 doublets et 1 électron célibataire

► L'oxygène étant un élément de la deuxième période , il ne peut pas être hypervalent : le nombre d'électrons autour de O ne peut pas dépasser 8

Q7. D'après la relation fondamentale des interactions matière – rayonnement $h\nu = \Delta E$, soit $\frac{hc}{\lambda} = \Delta E$

A. N. ($h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$) $\Delta E = 7,75 \text{ eV} = 7,75 * 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,24 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ $\lambda = 160 \text{ nm}$

Q8. Les espèces radicalaires sont très réactives d'où la difficulté à les isoler

En phase aqueuse condensée , le radical se trouve solvaté , ce qui peut modifier son énergie électronique d'où une différence de configuration électronique et une évolution du maximum d'absorption .

Par ailleurs en phase gazeuse , le spectre ne peut être que calculé et le modèle utilisé peut introduire des approximations , d'où les écarts avec le spectre expérimental.

Q9. En travaillant à basse température , on réduit la réactivité des radicaux et donc on allonge leur durée de vie .

La RPE est intéressante pour les espèces paramagnétiques , ce qui suppose de sélectrons célibataires , ce qui est bien observé pour les espèces radicalaires .

Q10. Le soufre et l'oxygène sont situés dans la même colonne : ils possèdent les mêmes propriétés chimiques . En particulier , HS et HO présenteront le même type de diagramme d'orbitales moléculaires et donc on pourra avoir les mêmes transitions .

Les transitions entre niveaux d'énergie vibrationnelle sont analysées par spectroscopie IR.

Exercice 2 (e3A, PC, 2019)

Q11. En considérant que le dioxyde de soufre a un comportement de gaz parfait :

$$\mu_{SO_2(g)} = \mu^{\circ}_{SO_2 GP(g)} + RT \ln \left(\frac{P_{SO_2}}{P^{\circ}} \right)$$

Q12. En se conformant aux indications de l'énoncé

$$\mu_{SO_2(aq)} \approx \mu_{SO_2}^{\infty \circ}(T) + RT \ln \left(\frac{C_{SO_2}}{C^{\circ}} \right)$$

$\mu_{SO_2}^{\infty \circ}(T)$ est le potentiel chimique du soluté A se trouvant dans un état hypothétique pour lequel il a le même comportement que s'il était en solution infiniment diluée et extrapolé à une concentration $C^{\circ} = 1 \text{ molL}^{-1}$, à T et sous $P^{\circ} = 1 \text{ bar}$

Q13. A l'équilibre : $\mu_{SO_2(g)} = \mu_{SO_2(aq)}$

A partir des expressions des potentiels chimiques, il vient :

$$-\mu_{SO_2}^{\infty \circ}(T) + \mu_{SO_2,GP}^{\circ}(T) = RT \ln \left(\frac{C_{SO_2}}{C^{\circ}} \frac{P^{\circ}}{P_{SO_2}} \right) = RT \ln K^{\circ}$$

Remarque : cette expression est simplement une écriture de la relation $\Delta_r G^{\circ} = -RT \ln K^{\circ}$!

$$\mu_{SO_2}^{\infty \circ}(T) - \mu^{\circ}_{SO_2 GP}(T) = RT \ln \left(\frac{P_{SO_2}}{P^{\circ}} \right) - RT \ln \left(\frac{C_{SO_2}}{C^{\circ}} \right) = -RT \ln K^{\circ}$$

A. N. A 25°C (298 K) , $-8,314 * 298 * \ln K^{\circ} = (-300,7 + 300,2).10^3$ **$K^{\circ} = 0,82$**

Q14. La réponse doit comporter tous les arguments figurant dans les conditions d'application de l'AEQS ..

Le radical SO_5° est un **intermédiaire réactionnel**. Il est consommé dans l'étape de constante de vitesse $k_4 = 1,0.10^{10} \text{ mol}^{-1}\text{Ls}^{-1}$ nettement plus élevée que la constante de vitesse de l'étape au cours de laquelle il est formé : l'AEQS peut donc lui être appliqué .

Q15. En se référant à l'équation bilan de la réaction (description macroscopique), la vitesse volumique peut

s'exprimer selon $v = \frac{d[SO_4^{2-}]}{dt}$

D'après le mécanisme (description microscopique) , $\frac{d[SO_4^{2-}]}{dt} = v_5$ soit $v = v_5$

Par ailleurs, l'application de l'AEQS conduit à

$$\frac{d[S_2O_6^{2-}]}{dt} = v_4 - v_5 \approx 0$$

$$\frac{d[SO_3^{\circ}]}{dt} = v_1 - v_2 - v_3 - v_4 \approx 0$$

$$\frac{d[SO_5^{\circ}]}{dt} = v_3 - v_4 \approx 0$$

On obtient ainsi $v = v_5 \approx v_3 = k_3 [SO_3^{\circ}][O_2]$

Et $v_1 - v_2 \approx 2v_3$: $[SO_3^{\circ}] \approx \frac{k_1 [HSO_3^-][Fe^{3+}]}{k_2 [H^+][Fe^{2+}] + 2k_3 [O_2]}$

En conclusion

$$v = \frac{k_1 k_3 [HSO_3^-][Fe^{3+}][O_2]}{k_2 [H^+][Fe^{2+}] + 2k_3 [O_2]}$$

Q16 Plus précisément , en faisant l'hypothèse $k_2[H^+][Fe^{2+}] \ll 2k_3[O_2]$:

$$v \approx \frac{k_1[HSO_3^-][Fe^{3+}]}{2}$$

v est indépendante de la concentration en O_2

Etude de la molécule SF_6

Q17. Les orbitales a_{1g} et t_{1u} plus basses en énergie que les orbitales de fragment dont elles sont issues sont **liantes** .

Les orbitales a_{1g}^* et t_{1u}^* plus hautes en énergie que les orbitales de fragment dont elles sont issues sont **anti-liantes** .

Les orbitales e_g sont **non liantes** .

Q18. Le soufre a 6 électrons de valence et au fragment $H6$ correspondent $6 \times 1 = 6$ électrons de valence , d'où un totale de 12 électrons à répartir sur les orbitales moléculaires . La configuration électronique s'écrit alors :

Q19. Par analogie à l'indice de liaison des diatomiques , on obtient

$$i = \frac{1}{2}(n - n^*) = \frac{1}{2}(8 - 0) = 4$$

Cet indice de liaison est donc inférieur au nombre de liaisons égal à 6 .

Q20. A titre de rappels , la représentation des orbitales $3d_{z^2}$ et $3d_{x^2-y^2}$ est la suivante :

La seule orbitale de fragments pouvant donner un recouvrement non nul avec $d_{x^2-y^2}$ est une orbitale développée selon les axes Ox et Oy avec des phases opposées selon ces deux axes : il s'agit de l'orbitale ϕ_5

De même la seule orbitale de fragment pouvant donner un recouvrement non nul avec d_{z^2} est l'orbitale ϕ_6 .

Le diagramme des OM de SF_6 doit alors être complété en introduisant ces interactions , ce qui fait apparaître 2 nouvelles orbitales liantes :

Remarque : on a aussi deux nouvelles anti-liantes mais elles ne sont pas représentées .

La nouvelle configuration électronique s'écrit :

et alors on retrouve un indice de liaison

$$i = \frac{1}{2}(n - n^*) = \frac{1}{2}(12 - 0) = 6$$

(on notera que l'hypervalence du soufre peut s'interpréter en faisant intervenir les orbitales 3d ..)

Exercice 3 : (Agrégation , concours externe , 2021)

Q21. Une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image par un miroir plan .

Deux stéréoisomères sont deux isomères qui **ne** se différencient **que** par leur stéréochimie .

Deux énantiomères sont deux stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables .

Deux diastéréoisomères sont deux stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères .

Q22. A partir des relations précédentes , on obtient :

Q23. Le classement CIP des substituants de l'atome de carbone stéréogène est la justification attendue :

Les stéréoisomères responsables de l'activité herbicide sont les **stéréoisomères 1 et 3**.

Exercice 4 (Banque Agro Veto , 2021)

Q24. 2,3-diméthyl-butane-2,3-diol

Q25 . Question très classique ...préparation d'un organomagnésien mixte .

Equation bilan :

Solvant : Et_2O ou THF (ce doit être un solvant non protique , polaire et nucléophile)

Pour les dérivés vinyliques , le THF est privilégié .

Précautions : milieu rigoureusement anhydre , introduction progressive de la solution du dérivé bromé sur le magnésium en suspension dans l'éther et éviter la présence de O_2 .

Q25. Par addition nucléophile de l'organomagnésien sur la cétone suivie d'hydrolyse acide on obtient :

Mécanisme :

Le composé 5 est un diol qui peut être obtenu par dihydroxylation de la double liaison . Pour cela on peut utiliser **OsO₄** .

Q26. Une flèche indique le transfert de deux électrons .

Pour indiquer le transfert d'un seul électron on utilise une « demi » flèche :

Mécanisme :