1. On considère un mélange liquide contenant plusieurs espèces A_i à une température T et sous une pression P . On donne ci-dessous la courbe représentant les variations de $Y = \mu_i(T, P) - RT \ln x_i$ en fonction de la fraction molaire x_i . On négligera l'influence de la pression.

a. En considérant comme état standard celui usuellement utilisé pour les mélanges, rappeler l'expression du potentiel chimique d'une espèce liquide dans un mélange idéal et dans un mélange réel.

b. On introduit un nouvel état de référence; un état hypothétique où l'espèce A_i serait infiniment diluée extrapolé à $x_i = 1$ de telle sorte que son potentiel chimique s'exprime selon

$$\mu_i(T, P) = \mu_i^{\infty x}(T, P) + RT \ln(\gamma_i^{\infty} x_i) \quad \text{avec} \quad \lim_{x_i \rightarrow 0} \gamma_i^{\infty} = 1$$

Indiquer alors l'expression du potentiel chimique d'un soluté en solution infiniment diluée, en solution diluée.

c. Déterminer l'expression des ordonnées 1 et 3. Donner l'expression des différences 2 et 4.

2. Enthalpie réticulaire d'un solide cristallisé ionique

Pour l'oxyde de chrome Cr_2O_3 , l'enthalpie réticulaire est par définition l'enthalpie de réaction associée à la réaction dont l'équation bilan s'écrit $\text{Cr}_2\text{O}_3(\text{s}) \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{g}) + 3 \text{O}^{2-}(\text{g})$

Exprimer puis évaluer l'enthalpie réticulaire de $\text{Cr}_2\text{O}_3(\text{s})$ en fonction des différentes grandeurs thermodynamiques fournies ci-dessous. On pourra utiliser un cycle.

Données

Enthalpie standard de formation de Cr_2O_3 solide $\Delta_f H^\circ = -1145,8 \text{ kJmol}^{-1}$

Enthalpie standard de fusion du chrome solide $\Delta_{\text{fus}} H^\circ = 16,9 \text{ kJmol}^{-1}$

Enthalpie standard de vaporisation du chrome : $\Delta_{\text{vap}} H^\circ = 344,3 \text{ kJmol}^{-1}$

Enthalpie standard de double attachement électronique à 0 K, associée à la réaction : $\text{O}(\text{g}) + 2 e \rightarrow \text{O}^{2-}(\text{g})$

$$\Delta_{\text{ae}} H^\circ = 638,7 \text{ kJmol}^{-1}$$

Enthalpie standard de dissociation du dioxygène $D_{\text{O}=\text{O}} = 493,6 \text{ kJmol}^{-1}$

Enthalpie de triple ionisation à 0 K associée à la réaction $\text{Cr}(\text{g}) \rightarrow \text{Cr}^{3+}(\text{g}) + 3 e$; $\Delta_{\text{ion}} H^\circ(\text{Cr}) = 5135,8 \text{ kJmol}^{-1}$

3. L'urée est un composé organique de formule $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$. Exprimer puis évaluer l'enthalpie standard de formation de l'urée solide en utilisant les données à la fin de l'énoncé et en expliquant la méthode.

Expérimentalement, l'enthalpie standard de formation de l'urée solide a pour valeur $\Delta_f H^\circ(\text{urée}(\text{s})) = -333,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$. Commenter la différence observée avec la valeur calculée précédemment.

Données :

Enthalpie standard de sublimation du carbone : $\Delta_s H^\circ(\text{C}_{(\text{gr})}) = 720 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Enthalpie standard de sublimation de l'urée : $\Delta_s H^\circ(\text{urée}(\text{s})) = 110 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Liaison	H - H	C - N	N - H	C = O	O = O	N $\equiv$ N
Enthalpies de dissociation $\Delta_{\text{dis}} H^\circ$ (en kJ.mol^{-1})	431	293	389	735	494	946

4. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de combustion d'une mole d'alcane C_nH_{2n+2} , exprimer littéralement en fonction des données fournies puis sous forme semi numérique son enthalpie standard $\Delta_r H^\circ_{298}$ en fonction de n , en kJ mol^{-1} .

Données :

▪ Enthalpies standard de formation à 298K, notées $\Delta_f H^\circ$ en kJ mol^{-1}

	$\text{CO}_{2(g)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$	$\text{C}_{(g)}$
$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol^{-1})	- 330	-286	719

▪ Enthalpies standard de dissociation à 298 K notées $\Delta_d H^\circ$

	H – H	C – C	C – H
$\Delta_d H^\circ$ (kJ mol^{-1})	431	360	418

5. Synthèse de l'éthanol selon $\text{CH}_2=\text{CH}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} = \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(g)}$

Industriellement cette synthèse est réalisée en phase gazeuse homogène à $T = 400\text{K}$.

Exprimer puis évaluer $\Delta_r G^\circ$ (400K)

Données : Enthalpies standard de formation et entropies molaires standard à 298K

	$\text{CH}_2=\text{CH}_{2(g)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(g)}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(g)}$
$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol^{-1})	52,5	- 241,8	- 235,1
S° ($\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$)	219,6	188,8	282,7

Les réactifs étant introduits en proportions stoechiométriques, on appelle taux d'avancement noté τ , le rapport entre le nombre de moles d'éthanol formé sur le nombre de mole d'éthylène initial.

Exprimer $\Delta_r G$, $\Delta_r S$ et $\Delta_r H$ en fonction des grandeurs standards, de τ , de P et T .