TP2 : L'acide phosphorique en solution aqueuse

L'acide phosphorique H_3PO_4 est principalement destiné à la fabrication d'engrais phosphatés, engrais le plus souvent employés, en association avec l'élément azote. En 2022, la capacité mondiale de production est de 220 millions de t, la Chine étant le premier producteur.

L'acide phosphorique est préparé à partir de phosphates naturels, par attaque à l'acide sulfurique.

Dans l'Union européenne, la seule mine de phosphates en activité, exploitée par [Yara](#), est située en Finlande, à Siilinjärvi. Sa production, en 2020, a été de 995 000 t.

Les objectifs de ce TP sont d'illustrer

- la méthode de synthèse industrielle de l'acide phosphorique
- les titrages acido-basiques en solution aqueuse

1^{ère} partie : obtention de l'acide phosphorique

Conformément à la synthèse industrielle, l'acide phosphorique est préparé par action de l'acide sulfurique sur du phosphate de calcium contenu dans les minerais.

Le mode opératoire à mettre en œuvre est le suivant :

Introduire dans un bécher de 250 mL, 75 mL de la solution d'acide sulfurique de concentration $C = 0,5 \text{ molL}^{-1}$. Ajouter progressivement sous agitation 3,90 g de phosphate tricalcique. Après une quinzaine de minutes d'agitation, filtrer, laver le solide à l'eau distillée et **recupérer le filtrat**. Le solide s'identifie à du phosphogypse (sulfate de calcium dihydraté); le sécher à l'étuve à 50°C pendant 30 minutes. Peser après séchage.

Aspect expérimental :

Masse réellement pesée notée sur le compte rendu :

Filtration : justification de l'utilisation du Büchner (solide produit d'intérêt) :

Q1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction modélisant la transformation chimique réalisée.

Formule correcte du phosphogypse :

Equation bilan correcte (conservation de P) :

Q2. Quel est le rôle du lavage à l'eau distillée ?

à condition que les impuretés soient identifiées.

Q3. A partir de la masse de phosphogypse sec, évaluer le rendement en acide phosphorique et l'utiliser pour évaluer la masse de minerai (phosphate tricalcique) nécessaire à la production d'une tonne d'acide phosphorique.

Expression générale du rdt :

Calcul des quantités de matière des réactifs + réactif limitant :

Valeur du rendement et commentaire (!) :

La suite a pour but de déterminer une deuxième estimation de ce rendement en procédant à un titrage acido-basique du filtrat.

2^{ème} partie : Titrage acido-basique du filtrat

Q4. Rappeler la chaîne de mesure d'un pH. Indiquer comment étalonner le pH-mètre si besoin.

Expression de la grandeur mesurée : différence de potentiel entre une électrode indicatrice et une électrode de référence qui conduit à $U = a + b\text{pH}$ [1]

Chaîne de mesure : électrode de verre (électrode indicatrice spécifique du pH) + électrode de référence reliées à un pH-mètre

Ou électrode de verre combinée reliée au pH-mètre : c'est ce qui a été utilisé [1]

(pas de point si électrode de verre non mentionnée)

Étalonnage : on fixe les valeurs de a et b : 2 mesures avec solution tampon [1]

Q5. Expérience 1 : Diluer 5 fois la solution d'acide sulfurique fournie et procéder au dosage pH-métrique d'un échantillon de 5 mL de la solution diluée par la soude de concentration $C = 0,10 \pm 0,01 \text{ molL}^{-1}$.

Matériel adapté à la dilution noté sur le CR : fiole jaugée de 50 mL et pipette jaugée de 10 mL : [2]

Titration : pipette jaugée de 5 mL : [1]

Reflexion sur l'ajout d'eau - volume d'eau noté sur le CR : [1] + [1]

Résultats : courbe annotée sur le CR - détermination de V_e (précision de la méthode utilisée pour déterminer V_e) , valeur de V_e clairement notée et mise en évidence [2]

Exploitation : vérification de la cohérence de la valeur du V_e avec les données ($C = 0,5 \text{ molL}^{-1}$) : [2]

Q6. Expérience 2 : Prélever 10 mL du filtrat et diluer 10 fois. Doser 20 mL de la solution diluée par la soude de concentration $C = 0,10 \pm 0,01 \text{ molL}^{-1}$. Tracer soigneusement la courbe de variation du pH au cours de ce dosage.

Matériel adapté à la dilution noté sur le CR : fiole jaugée de 100 mL et pipette jaugée de 10 mL : [1]

Résultats : courbe annotée sur le CR - détermination de V_e (précision de la méthode utilisée pour déterminer V_e) [2]

Résultats : courbe annotée sur le CR - détermination de V_e (précision de la méthode utilisée pour déterminer V_e) , valeurs de V_e clairement notées et mises en évidence [2]

Observations :

-2 équivalences : différent du dosage de H_2SO_4 : ceci confirme que la réaction a bien formé un autre acide
Et plusieurs acidités dosées en même temps vraisemblablement [2]

-Observer V_{e2} différent de $2 V_{e1}$ [1]

Q7. A l'aide du logiciel DOZZZAQUEUX, tracer la courbe de simulation de dosage pH-métrique de 10 mL d'une solution d'acide phosphorique par une solution de soude, on prendra la même concentration pour les 2 solutions $C = 0,1 \text{ molL}^{-1}$.

Interpréter l'allure de cette courbe.

L'interprétation doit comporter

- l'identification des espèces dosées à chacune des équivalences : [2]

- l'écriture des équations-bilan des réactions support pour les deux équivalences [1]

- l'explication de l'absence de dosage pour la 3^{ème} acidité : [1]

- l'adéquation des valeurs des V_e aux caractéristiques du dosage (écriture des relations aux équivalences et $V_{e2} = 2 V_{e1}$) : [2]

Q8. A l'aide du logiciel DOZZZAQUEUX, tracer la courbe de simulation de dosage pH-métrique de 10 mL d'une solution constituée d'un mélange d'acide phosphorique (concentration $C_P = 0,1 \text{ molL}^{-1}$) et d'acide

sulfurique (concentration C_S) par une solution de soude de concentration $C = 0,5 \text{ molL}^{-1}$.Faire varier la concentration C_S : $0,05 \text{ molL}^{-1}$ $0,1 \text{ molL}^{-1}$ $0,2 \text{ molL}^{-1}$

Interpréter l'allure des courbes obtenues et leur évolution avec la concentration C_S .

- Observations : V_{e1} évolue avec la quantité d'acide sulfurique $\Rightarrow$ cet acide est dosé pour $V < V_{e1}$ [1]

$V_{e2} - V_{e1}$ invariable $\Rightarrow$ pour $V_{e1} < V < V_{e2}$, on dose une (ou des ...) acidités uniquement de H_3PO_4 [1]

-identification des espèces dosées à chacune des équivalences et écriture des équations -bilan des réactions support pour les deux équivalences : [2]

Q9. Interpréter la courbe expérimentale ; en déduire en fonction des volumes équivalents observés le rendement de sa formation ; **l'expression du rendement doit être établie uniquement en fonction des volumes équivalents .**

Comparer à la valeur obtenue à partir de la masse de phosphogypse .

Utilisation des observations sur la courbe expérimentale [2]

1) Valeurs de pH aux 2 équivalences compatibles avec celles de la courbe simulée on peut confirmer la formation de l'acide phosphorique

2) On a $V_{e2} < 2 V_{e1}$: il reste un peu d'acide sulfurique

Utilisation des relations aux équivalences de la question Q8 pour déterminer les quantités relatives de H_3PO_4 et H_2SO_4 : [2]

Expression du rendement en fonction des 2 V_e : [2]

Calcul du rendement : [1]

Commentaire : conclure sur la meilleure estimation du rendement par ce dosage , noter que ce calcul est indépendant du volume du filtrat et donc même si on a rajouté « trop » d'eau pour le lavage , on peut utiliser cette méthode ! [2]

Q10. Connaissez vous des applications du phosphogypse ? [1]

Q11 . Pour aller plus loin : titrage de la soude par H_3PO_4 : A l'aide du logiciel DOZZZAQUEUX , tracer la courbe de simulation de dosage pH-métrique de 10 mL d'une solution de soude $C = 0,01 \text{ molL}^{-1}$ par une solution d'acide phosphorique de même concentration .

Interpréter cette courbe en indiquant les équations bilan des réactions support du dosage dans les différentes parties de la courbe .

- identification des espèces dosées à chacune des équivalences : [2]

-écriture des équations -bilan des réactions support pour les deux équivalences [2]

- l'adéquation des valeurs des V_e aux caractéristiques du dosage (écriture des relations aux équivalences) : [2]

Données :

Masses molaires en gmol^{-1} H : 1 O : 16 S = 32 Ca : 40

L'acide sulfurique est un diacide , la première acidité est forte , la deuxième est caractérisée par $\text{pK}_a = 2$

L'acide phosphorique est un triacide en solution aqueuse .

Phosphate tricalcique	Formule: $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ Poids moléculaire: 310,18 g/mol Point de fusion: 1670 °C Densité: 3,14 g/cm ³ (20 °C)

Solution aqueuse d'acide sulfurique (H ₂ SO ₄)	Formule: H ₂ SO ₄ Poids moléculaire: 98,08 g/mol
Solution aqueuse de soude (Hydroxyde de sodium)	Formule: NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: ~105 °C (1013 hPa) Densité: 1,327 g/cm ³ (20 °C)